

Skrzywienie przegrody nosa (deviatio septi nasi)

Jest to dosyć powszechne zjawisko. Jeżeli nie wiąże się z zaburzeniem drożności nosa, nie wymaga postępowania operacyjnego. Przyczyną skrzywienia przegrody nosa mogą być zaburzenia rozwojowe lub uraz. Rozpoznanie opiera się na badaniu wziernikowym nosa, uzupełnionym ewentualnie badaniem endoskopowym.

Przebieg zabiegu

Operacja przegrody nosa (septoplastyka) odbywa się w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym i wiąże się z kilkudniowym pobytem szpitalnym. Polega ona na podśluzówkowym ustawieniu elementów chrzęstnych i kostnych przegrody nosa, przywracającym drożność i prawidłowe warunki anatomiczno – fizjologiczne nosa. Na zakończenie zabiegu stosuje się opatrunki wewnątrznosowe i/lub silikonowe płytki stabilizujące.

Po zabiegu

Przed wypisem pacjenta usuwamy opatrunki wewnątrznosowe. Płytki stabilizacyjne utrzymuje się w nosie przez okres 1 – 2 tyg. Zaleca się unikanie wysiłków fizycznych przez okres 2-3 tygodni po operacji.

Możliwe powikłania po zabiegu:

- krwawienie z nosa,
- perforacja przegrody nosa,
- ropień przegrody nosa,
- zaburzenia węchu.